

Diarrhées et Vomissements



Vomissements

Base

Rejet du contenu de l'estomac involontaire

Activation du système nerveux sympathique et parasympathique

- Diagnostics différentiels :
 - Ruminaction
 - Régurgitation
 - Vomique



Complications

Troubles hydro-électrolytiques

Dénutrition

Arrêt des traitements

Mécanique :

- œsophagite

Complications

Troubles hydro-électrolytiques

Dénutrition

Arrêt des traitements

Mécanique :

- Oesophagite
- Syndrome de Mallory-Weiss
- Rupture de l’œsophage
- Inhalation bronchique avec pneumopathie
- Hémorragie sous conjonctivale
- Fractures de cote

Abdomino-pelviennes**Chirurgicales****Toxiques****Neurologiques****Métaboliques****Autre**

Gastro-entérite

Coliques (bis)

Syndrome labyrinthique

IRA

IDM inférieur

TIAC

Cholécystite

Migraine

Troubles hydro électrolytique (K+, Ca+, Na+)

Glaucome aiguë

Colique hépatique

Infarctus mésentérique

Traumatisme crânien

Hypoglycémie

Grossesse

Colique néphrétique

Torsion d'annexe

HSA

Insuffisance surrénale aiguë

Post-opératoire

Torsion de kyste

HTIC

Radiothérapie

Pancréatite aiguë

GEU


Méningite

Hyperthyroïdie


Mal des transports

Psychogène


Mécanique	Fonctionnelle
Néoplasie gastrique	Gastroparésie / sclérodermie / Amylose / Diabète
Tumeur pancréatique ou pseudo kyste pancréatique	Post chirurgicale , Vagotomie
Adénocarcinome	POIC
Carcinose péritonéale	
Crohn	HTIC
Radiothérapie	Epilepsie
AINS	
Bride	Grossesse / Môle hydatiforme
Hernies	Hyperemesis gravidarum
Volvulus	
Invagination	Chimiothérapie




- Métabolique




- Métabolique
- Toxique




- Métabolique
- Toxique
- Neurologique



- Métabolique
- Toxique
- Neurologique
- Digestif
 - Mécanique
 - Fonctionnelle



- Métabolique
- Toxique
- Neurologique
- Digestif
 - Mécanique
 - Fonctionnelle
- Autre stimulation parasympathique



Traitements

- Métoclopramide
- Dompéridone
- Métopimazine
- « Sétron » (Ondansétron, grani-sétron ...)
- Aprépitant
- Corticothérapie

Take Home Message



**VOMISSEMENT
= SYMPTÔME**



**TRAITER ET RECHERCHER
LES SIGNES DE GRAVITÉ**



**RÉFLÉCHIR AUX
ÉTIOLOGIES DE MANIÈRE
SYSTÉMATIQUE**

Diarrhée

Aiguë :

- **3 selles liquides/jours**
- **300 g/j**

Dysentérique	Cholériforme
Fièvre	
Glaireuse	Apyrétique
Sanglante	Liquidienne
Epreintes	Abondante
Ténesme	

Chronique

Diarrhée > 7 jours



Exploration gastro-enterologique

- Infectieuse :
 - Aiguë
 - Chronique
- Dysimmunitaire / Inflammatoire
 - MICI
 - Maladie Cœliaque
- Effet indésirable d'un médicament
 - Osmotique ou Inhibition digestion (glucidique, lipidique)
 - Sécrétoire
- Colite microscopique
- Motrice (TSH, trouble ionique, cortisol ...)

Rechercher
des signes de
gravités




Choc hypovolémique

Déshydratation extracellulaire
soif, oligurie,
hypotension arterielle,
tachycardie, pli cutanée, cernes,
hypotonie des globes oculaires,
muqueuses sèches,
trouble de la vigilance



Examen physique :

Défenses
Signes extra digestifs



Diagnostic

Syndrome dysentérique :

- Infectieux
 - Bactérien
 - Parasitaire (Amibiase, cyclosporose, syphilis)
 - Virale (CMV, HSV)
- MICI

Syndrome Cholériforme

- Infectieux
 - Bactérie via mécanisme toxinique
- Traitement

Autre

- Fausse diarrhée
- Stéatorrhée / malabsorption

Aliments ingérés	Intoxications et infections intestinales possibles
Les dernières 24 heures	Intoxication par :
pâtisserie et viande manipulées	<i>Staphylococcus aureus</i>
riz, soja ayant séjourné en air ambiant	<i>Bacillus cereus</i>
plats cuisinés	<i>Clostridium perfringens</i>
coquillages crus ou cuits	toxines produites par les dinoflagellés
Les dernières 12 à 48 heures :	Infection par :
coquillages crus	virus ronds et vibrios
aliments à base d'oeuf cru	
poulet rosé ou acheté en rôtisserie	<i>Salmonella</i>
produits laitiers non pasteurisés	
Les dernières 24 à 72 heures :	Infection par :
poulet rosé ou acheté en rôtisserie	<i>Campylobacter sp.</i>
produits laitiers non pasteurisés	
viande de bœuf crue (surtout hachée)	<i>Escherichia coli</i> entéro-hémorragique
viande de porc (charcuterie)	<i>Yersinia enterocolitica</i>

Cas particulier : Clostridium difficile

Diagnostic :

- Combinaison de signes et symptômes
- Mise en évidence de *C. difficile* producteurs de toxines et de la toxine en l'absence d'autre étiologie
- ou Mise en évidence histologique ou à la colonoscopique d'une colite pseudo-membraneuse

Recherche de *Clostridium difficile* par ensemencement des selles sur milieu sélectif

Méthode immunoenzymatique ou test de référence par cytotoxicité des selles

Traitements des diarrhées



Symptomatique:

- Ralentisseurs du transit (lopéramide et oxyde de lopéramide)
- Anti sécrétoire : racécadotril

Antalgique :

- Paracétamol
- Anti spasmodique

Etiologique

- Antibiothérapie
 - Adapté à la situation
 - Ciprofloxacine
 - Metronidazole
 - C. Difficile : Vancomycine PO

Take Home Message



TRAITER L'URGENCE
RECHERCHER LES SIGNES
DE GRAVITÉ



ANAMNÈSE =
DIAGNOSTIC



RÉFLÉCHIR AUX
ÉTILOGIES DE MANIÈRE
SYSTÉMATIQUE



SE MÉFIER DES
TRAITEMENTS